

УДК 581. 19: 633. 88 (235. 21 6)

Н.М. Мұхитдинов, Н.И. Дүйсенова, А.Т. Тұяқова

ASTERACEAE DUMORT. ЖӘНЕ LAMIACEAE LINDL. ТҮҚЫМДАСТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДӘРІЛІК ТҮРЛЕРІНІҢ ФИТОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ

«Маңғышлақ эксперименталдық ботаникалық бағы» РМК, Ақтау қаласы

Мақалада Asteraceae Dumort. және Lamiaceae Lindl. түқымдастарының Алматы облысында екпе жағдайында өсірілген дәрілік алты түрлерінің емдік мақсатта қолданылатын шикізаттың фитохимиялық құрамына сапалық және сандық сараптама нәтижелері сипатталған.

Қазақстан – өсімдіктеге бай өлке. Өсімдіктану (ботаника) ғалымдарының дәлелдеуінше, республикамызда 6000 жуық өсімдіктің түрі бар екен. Соның 700-ге жуығы дәрілік өсімдіктер [1]. Мұндай мол дәрілік шикізат қорының бүгінгі танда 84 түрін егістік жағдайда өсіріп, тұрақты агроценоздан сапасы жоғары бірыңғай шикізат алуға болатындығы белгілі [2]. Ал осындағы бай шикізат қорынан қазіргі дәрілік препараттар даярлауға тек 45 түрі ғана пайдаланылады. Біздің ойымызша бұл келенсіздіктің басты себебі дәрілік өсімдік түрлерінің жалпы биологиялық және фитохимиялық зерттелуіне мемлекеттік түрліден жеткіліксіз көңіл болінбейінде және биолог-ботаниктер мен фармаколог, химик мамандардың ғылыми зерттеулерінің үйлесімді жүргізілмеуінде.

Биологиялық белсенді заттар (ББЗ) өсімдіктің әр түрлі мүшелерінде оның белгілі бір даму кезеңдерінде жинақталады, ББЗ бір өсімдіктің жапырақтарында, сабактарында, ал екіншілерінің гүлдерінде немесе жемістерінде (түқымында), ал үшіншілерінің тамырында, тамыр-сабағында немесе қабықтың болігінде жинақталып, ББЗ мөлшері өсімдіктің вегетациялық даму фазасының әр түрлі кезеңдерінде тұрақты болмай өзгеріп отырады. Сондықтан дәрілік өсімдіктерді дұрыс пайдалану үшін олардың әрбір мүшелерінің онтогенезіндегі өсіп қалыптасу ерекшеліктерін білу барынша маңызды.

Өсімдіктердің морфологиялық пішіні мен анатомиялық құрылымы оның өмір сүру жадайына, ортасына тікелей тәуелді. Өсімдік құрылымына әсер етуші табигаттағы экологиялық факторлар әртүрлі, олар – ауа температурасы, топырақ ылғалдылығы мен құнарлылығы, жаражық т.с.с. Бұл факторлар өсімдіктің пішіні мен құрылышынан басқа, ББЗ химиялық құрамына да зор ықпалын тигізері анық. Сол себепті өсімдіктерге биологиялық зерттеулермен қатар химиялық сараптамалар жасау жаңа дәрілік тұрлердің ашылуына мүмкіндік беретіні мәлім.

Зерттеу мақсаты

Asteraceae Dumort. және Lamiaceae Lindl. түқымдастарының екпе жағдайында (Алматы облысында) өсірілген 6 дәрілік түрлерінің емдік мақсатта кеңінен қолданылатын шикізаттарына фитохимиялық сапалық және сандық сараптама жүргізу, ББЗ сипаттама беру.

Зерттеу объектісі мен әдістері

Зерттеу объектісі ретінде халықтық және ресми медицинада мақұлданған *Asteraceae Dumort. Түқымдастының дәрілік – Echinops sphaerocephalus L., Silybum marianum (L) Gaertn., Tanacetum vulgare L.* және *Lamiaceae Lindl.* түқымдастының *Nepeta cataria L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Melissa officinalis L.* алты түрлері алынды.

Зерттеуге алынған түрлер Алматы облысы Қарасай ауданындағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ботаника және экология кафедрасының ғылыми-өндірістік кешені «ЭКОС» тәжірибелік станциясында екпе жағдайында өсірілді. Фитохимиялық зерттеулер әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттің органикалық химия және табиғи қосылыстар химиясы кафедрасының зертханасында жүргізілді.

Фитохимиялық белгілі әдістер [3, 4] бойынша шикізаттың сапалылығы (ылғалдылығы, экстрактивті заттары, құлділігі) және биологиялық белсенді заттарына сандық, сапалық сараптама жасалды.

Сапалық құрамды зерттеу үшін қағазды және жүқа қабатты хроматография әдістері мен бутанол – сіркө қышқылы – су (40:12,5:29) еріткіштер жүйесі; шикізат құрамындағы алкалоид, флавоноид, кумарин, сапонин және каротиноид қосылыстарының сандық мөлшерін анықтау үшін спектрофотометрия (СФ-26 спектрометр аппаратында), бос амин қышқылдарының мөлшерін фотоколориметрия (ЛМФ-72 фотоэлектроколориметр), С дәруменін анықтауға титриметрия әдістері [3, 4] қолданылды.

Зерттеу нәтижелері және талқылау

E. sphaerocephalus – Қазақстанда шалғынды жерде, тасты, сазды тау баурайында, өзендердің аңғарында, дала және дала-орман аймағында өседі. Ол Тобыл, Есіл, Ертіс, қарағайлы Семей орманы, Кекшетау, Каспий ойпаты, Ақтөбе, Мұғаджар, Торғай, Батыс және Шығыс Сарыарқа, Алтайда таралған [5]. Емдік өсері бар биологиялық белсенді заты: эхинопсин алкалоиды (оның фармакологиялық табиғаты стрихинин және бруцин алкалоидтарына өте жақын, улы) және 26-28% шыны майлары бар.

Медицинада шикізат ретінде толық піскен түкімшаларын қолданады. Медициналық өндірісте тамырға енгізу үшін «1% эхинопсин нитратының ерітіндісі» 20 мл флаконда және инъекция үшін «0,4% эхинопсин нитратының ерітіндісі» 1 мл ампула түрінде шығарылады. Оны күніне екі рет тамақтан 15-20 минут бұрын 1%-тік ерітіндінің 10-20 тамшысын тамыр арқылы жіберу белгіленеді. Емделу ұзақтығы 20-30 күн. Эхинопсинді тек стационарда ғана емес, амбулаторлық жағдайда да кең қолдануға болады, себебі оның көрі өсері жоқ [6, 7].

S. Marianum Қазақстанда *Silybum* туысының бір ғана түрі бар, яғни ол монотипті. Республиканың шөлейт аймақтарында, жол бойында және бақшада арамшөп түрінде, Қызылорда облысында, Іле-, Құнгей Алатауында, Батыс Тянь-Шаньда өседі [5].

Медицинада шикізат ретінде толық піскен шубар ала түкімшаларын пайдаланады. Шубар ала жемісі отандық фармакопеяның 1-3 басылымдарына енген, силибинин және силибор препараттары гепатопротекторлық және антиоксиданттық өсері бар, сондықтан клиникалық практикада қолданылу ұсынылған. Гепатитке, өтке тас жиналғанда, асцитке, плевритке гомеопатия түнбасы ем [8, 9].

T. vulgare – орман және дала аймақтарында, өзен жағалауында, тау етектерінде, тау арасындағы ойпаттарда, жол бойында, арамшөп ретінде егістікте, тыңайған жерлерде, таудың орман белдеуінде, субальпі шалғында өседі. Қазақстаниң барлық аудандарында кездеседі, бірақ құмды шөлейтті ыстық жерлерде өспейді [5].

Медицинада шикізат ретінде гүлдеудің алғашқы кезеңіндегі себеттерін гүлсағақсыз жинаайды. Отандық фармакопеяның 1-3 басылымдарына енген [4, 8], ғылыми медицинада гүлшоғырынан дайындалған ұнтағы мен сулы түнбасын бауыр (гепатит, англиохолит), ішек ауруларына, аскаридоз және бөсір (ұшқірқұрт) кезінде қолданады. Гүлшоғырынан дайындалған түнбасы жүрек соғысын төмендетіп, қан қысы-

мын көтеретіндігін, гепатит кезінде өт құрамындағы шырышты төмендетіп, өт бөлінуді қүштейтіндігін, ақсазан – ішек жолдары бездерінің сөл бөлін арттырып, оның бұлышық еттерін сергітетіндігін эксперимент кезінде дәлелденген.

N. cataria – бағалы эфир майлары және бал беретін өсімдік. Батыс Тянь-Шаньда, Қаратауда, Жоңғар Алатауында, Батыс майда шоқылы қырраттарында, Манғыстауда, Торғайда, Мұғалжарда, Ақтөбеде, Ертісте бұталар арасында, шөгінді шалғынды тау беткейлерінде, тыңайған топырақты орманның ашық алаңдарында, өзен жағаларында, тау беткейлерінде, шалғындарда, егістіктерде, бақшаларда, арамшөпті жерлерде, таудың орта белдеулерінде өседі [5].

Дәрілік мақсатта өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі пайдаланылады. Шикізатын гүлдеп түрған кезінде жинаайды. Халық медицинасында қайнатпа және тұндырма түрінде гастритке, іш кебуге, тәбет ашуға, өт айдағыш, қақырық түсіргіш ретінде, өкпе қабынуына, бронхит және бронхты астма ауруларына, тыныс жолдарының инфекциясына, гинекологиялық ауруларға, жас босанған әйелдердің денсаулығын қалпына келтіру үшін, бас ауруға, қан аздыққа қарсы және ірінді жаралар мен қотырға пайдаланады. Бактерияға қарсы белсенділігі жоғары. Жаңа жиналған шөбі дәм бергіш. Жапырағының түнбасын жүрек ауруларына, іш кепкенде, тіс ауруларына қолданылады. Шырыны және эфирлі сығындысының антифугалды, ал эфир майының антибактериалды және антифунгальды белсенділігі жоғары. Азық-түліктік тағамдарды консервілеуде (сүрлеуде) дәм бергіш ретінде кеңінен қолданылады, цитраль және гераниол эфир майларын алудың негізгі көзі, гүлшоғырының қайнатпасы дene қызын түсіреді [10].

L. quinquelobatus – Қазақстанда табиғи түрде кездеспейді. Тек Қазақстаниң кейбір аудандарында екпелі өсімдіктің емдік қасиеті үшін бақшада, егістікте өсіріледі.

Дәрілік шикізаты – өркені. Оның шөбін (шикізатын) өсімдік гүлдеу кезеңінде жоғарғы буынаралықтарынан ұзындығы 40 см-ден аспайтындей етіп жинаайды [1]. Ресми шикізат Ресейде Отандық фармакопеяның 8-10-басылымының құрамына кірген [11]. Гинекологиялық ауруларды емдеуге қолданылатын қоспалардың құрамына енген, сүт шығаруға (лактацияға) өсерін тигізеді. Халық медицинасында жүрек ауруларын, өкпе қабынғанда, эпилепсияға, жүйке ауруларына, ақсазан-ішек ауруларына, Украинада зобты емдеуде қолданады. Өсімдік шикізатындағы flavonoидтар arteriалды қан қысы-

мын төмендетеді. Тамырының қайнатпасын дисентерияға, түнбасы, түндышмасы және экстрактысын гипертониялық аурулардың бастапқы сатысында, жүрек – қан-тамыр неврозына, жүйкенің жоғары қозғыштығына тыныштандырыш өсери бар. Шырыны мен түнбасы асқазан-ішек жолдары ауруларына, практикалық медицинада кардиосклероз, миокардит және миокардиодистрофия, психоастения және неврастения сынды ауруларды емдеуде қолданады [11].

M. officinalis – Қазақстанда табиғи түрде Жоңғар-, Іле-, Құнгей- және Талас Алатауларында, Қаратауда өседі. Арамшөп ретінде бақта, жол бойында, егістікте, төменгі тау белдеулерінде өседі. Табиғатта үлкен көлемді қауымдастық құрмайды. Мәдени түрде өсіріледі [5].

Дәрілік шикізат ретінде медицинада жапырағы және сабағының жоғарғы буынаралықтары (гүлімен) пайдаланылады. Шебін гүлдеу кезінде жинайды. Жаңа жиналған шикізаттан лимон иісі байқалады. Дәрілік, эфирмайлы және бал беретін өсімдік. Өркені Италияда ресми түрде дәрілік шикізат. Шикізаты Ресейде Отандық фармакопеяның 1-4-басылымының құрамына [11, 12], Қазақстанда дәрілік өсімдіктер реестріне енген (фармакопеялық статьясының номері ВСФ РК 42-11-94, ФС РК 42-513-03). Сонымен қатар, ПФК «Қызылмай» өндіруші- фирмасының «Қызылмай» атты дәрілік препараттың құрамына 10.11.1998 жылдан бастап № ФС РК 42-212-98 статьясы бойынша кірген [2, 8]. Халық арасында оның түндырмасы мен қайнатпасын жүйке ауруларына, бронхтың қабынуына, ас қорытуға, іш өтуге, аяғы ауыр кезде токсикозға, қан тоқтатуға, тері бөртпесіне ішеді. Медицинада гиперацидті гастритті емдеуде қолданады. Шикі-

затының түнбасы асқазан жараларына, асқазан ауруларына, өт айдауға қолданады. Жапырағы көптеген елдерде ресми фармакопеяларына енген. Жапырағының түнбасы мен қайнатпасы медицинада қан аздықта, дene ісіктерінде, гайморитте, фарингидте, ағзаның жалпы қорғаныштық қызметтің күшеттеді және тәбет ашады, ревматизме, дene күйгенде, жаракаттануда ванна, компресс түрінде, пародонтоз болғанда ауыз қуысын шаюға қолданады. Эфир майын косметика мен парфюмерия өндірісінде де пайдаланады.

ББЗ химиялық құрамын анықтау үшін зерттеуге алынған объектілер екпе жағдайында өсіріліп, емдік мақсатта қолданылатын шикізаттары (*E. sphaerocephalus*, *S. Marianum* – өсімдіктегі түкімьы, *T. vulgare* – гүлсебеті, *N. cataria*, *L. quinquelobatus*, *M. officinalis* – жерүсті өркендегі) температурасы 23-25⁰C, күн көзі түспейтін, көлеңкелі әрі құрғақ бөлмеде кептірілді. Сапалық және сандық саралптау жасау үшін шикізаттар диаметрі 0,5 см електен өтетіндей ұнтақталды.

Осымдіктер шикізатының сапалылығын және ББЗ сандық мөлшерін анықтау үшін XI Мемлекеттік Фармакопеяда мақұлданған әдістер арқылы келесі көрсеткіштер анықталды: ылғалдылығы, экстрактивті заттары, күлділігі және ББЗ сандық мөлшері (Кесте 1).

Зерттеуге алынған өсімдіктердің ұнтақталған шикізатының 10%, 50% сулы спирттегі, бензол және этилацетаттағы ерітінділерін ар-найы ББЗ анықтайтын реактивтермен сынап, шикізат құрамында қандай ББЗ болатынын анықтадық. Тәжірибе нәтижесі 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Asteraceae Dumort. және Lamiaceae Lindl. түкімдасы кейбір дәрілік түрлерінің сапалылығы және биологиялық белсенеді заттарының мөлшері (%)

Шикізаттың сапалылығы және ББЗ мөлшері, %	Өсімдіктер атапу					
	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	<i>Silybum Marianum</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>	<i>Nepeta cataria</i>	<i>Leonurus quinquelobatus</i>	<i>Melissa officinalis</i>
Ылғалдылығы	3,31	5,96	7,3	8,34	5,87	4,74
Экстрактивті заттар	31,03	13,4	37,97	43,20	42,28	17,85
Күлділігі	3,8	5,8	5,2	5,86	6,70	4,99
Илік заттар	-	-	6,73	5,90	7,51	5,57
Флавоноидтар	2,7	5,9	9,3	9,59	17,34	4,12
Алкалоидтар	4,29	1,12	-	-	-	-
Сапониндер	-	-	6,27	7,95	2,94	0,07
Бос аминқышқылдар	0,49	0,18	0,41	0,51	0,59	1,19
Кумариндер	-	0,06	-	0,34	0,24	0,10

Каротиноидтар	-	-	8,48	-	-	0,95
С дәрумені	0,06	0,09	0,08	0,06	0,03	0,11

E. sphaerocephalus емдік мақсатта қолданылатын түкімінде алкалоид болатындығын Зонненштейн реактивіне жасыл-сары түс беруі дәлелдейді. Бірақ әдебиет мәліметтер [4, 6, 8] бойынша бұл өсімдіктің түкімінде флавоноид қосылыстары жоқ болғанымен, сулы спирт, бензол және этилацетаттағы ерітінділері AlCl_3 реактивіне ашық сары түс; аммиак буына сары түс; FeCl_3 1% ерітіндісіне күлгін түс беруі флавоноид қосылыстарының нақты болатындығын көрсетеді.

Арнайы реактивтердің *S. Marianum* және *T. vulgare* шикізаттарына әсері өсімдіктерде флавоноид, фенол қосылыстарының болатындығын; 1% нингидрин реактивіне әсері бос амин қышқылдарының бар екендігін сипаттайды.

T. vulgare спирттегі ерітіндісінің карбамидте (несеп нәрі) қоңыр түс көрсетуі қалпына келмейтін қанттардың, кетозаның болуы; темір-аммонийлі ашудас реактивіне қоңыр рең беруі илік заттардың бар екендігін дәлелдейді.

1-кестеде көрсетілгендей, *N. cataria*, *L. quinquelobatus*, *M. officinalis* өсімдіктерінің шикізаттарында қан тамырлары, ішек түйілуіне, асқазан мен он екі елі ішектің жараларын, бауырдың қабынуын емдеуде пайдаланылатын флавоноидтардың, әрқиыл жаралардың қабынуна қарсы, қан тамырларын тарылтуға, денеден ылғал мен түрлі қоймалжың заттардың бөлінуін тоқтатуға, асқазан-ішек ауруларына қарсы, ауыз қуысы және тері қабынуларына қарсы емдерге қолданылатын илік заттардың, ағзадағы минералды заттар алмасуын реттейтін, ферменттердің қызметін белсенділігін арттыратын, несеп айдағыш және қабынуға қарсы ем ретінде қолданылатын сапониндер, катерлі ісік ауруларының клеткаларының белсенділігін төмендететін және бактериялы ауруларға қарсы препараторлардың құрамына енетін кумариндер, ағзадағы амин қышқылдарының алмасуына, гормондардың түзілуіне қатысадын, қандағы холестериннің деңгейін реттейтін, әрі өте күшті антиоксидант – С дәрумені және тек *M. Offi-*

cinalis шикізатынан адам ағзасының иммундық жүйесін қүшеттіп, көздің қызметінің механизмине қатысадын, медициналық тәжірибеде әрқиыл тері ауруларын емдеуде қолданылатын каротиноидтардың бар екендігі анықталды.

Зерттеу нәтижесінде *E. sphaerocephalus* және *S. Marianum* түкімдарында алкалоид заттары болса, қалған төрт өсімдіктің емдік мақсатта қолданылатын гүлсебеті мен жерусті еркендерінде тіршілік үшін маңызды илік заттары мен сапониндер кездеседі. *T. vulgare* гүлсебеті сары түсті болғандықтан каротиноидтар тән, сол сияқты *M. officinalis* шикізатынан аз мәлшерде болса да каротиноид заттары анықталды.

Lamiaceae Lindl. түкімдасының зерттеуге алынған барлық түрлерінде кумарин заттары болса, ал *Asteraceae* Dumort. түкімдасынан ол – жалғыз ғана *S. Marianum* өсімдігінде болды. Тәжірибе барысында барлық зерттеуге алынған өсімдік түрлерінен флавоноид, бос аминқышқылдары және С дәрумені сипатталды.

Өсімдіктер құрамындағы минералдық заттардың мәлшері өсken ортасына, топырақ құрамына, ылғалдылыққа және т.б. факторларға байланысты өзгеріп отырады. Макро-, микроэлементтер тіршілік үшін маңызды, атап айтқанда жүйке жүйесінің, бұлшықеттердің және жүректің жұмысын күшейтуге, асқазан сөлінің концентрациясын реттеуге, ағзадан судың және хлорлы натрийдің артық мәлшерлерін шығаруға, ацетилхолиннің түзілуіне, қандағы артериалды қысым деңгейін реттеуге, бұлшықет жүйкелерінің қозу процестеріне, ферменттердің жұмысын жылдамдатуға, жүрек бұлшықетінің жұмысына және қанның үюнина, жүйкенің қозу, көмірсу, және фосфор асмасу процестеріне, ағзаны ишемия, стенокардия және инфаркт сияқты жүрек ауруларының алдын алуға белсенді түрде қатысады.

Шикізаттың жалпы күлін, күл қалдығынан атомды – абсорбциялық спектроскопия әдісімен он екі макро- және микроэлементтерді анықтадық (кесте 2).

Кесте 2 – Зерттелген түрлердің шикізатындағы макро-, микроэлементтер (мкг/г)

Макро-, микроэлементтер	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	<i>Silybum marianum</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>	<i>Nepeta cataria</i>	<i>Leonurus quinquelobatus</i>	<i>Melissa officinalis</i>
Мкг/г, 1г=1000мг=1000000 мкг-рпм						
Na	72,25	27,55	100,25	12,65	141,60	209,21

K	400,0	120,4	1223,3	233,0	139,8	5081,26
Ca	118,0	175,0	395,0	2160,0	120,2	4424,89
Mg	22,29	18,48	41,85	64,45	27,72	3964,02
Fe	25,95	30,81	16,22	0,10	0,06	<0,48
Zn	0,78	4,32	2,08	1,23	6,74	4,35
Mn	1,63	0,92	2,75	0,73	0,97	30,16
Cd	0,08	0,08	0,10	22,16	82,16	192,91
Cu	0,32	3,88	0,69	0,46	4,36	4,07
Ni	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	1,36
Co	< 0,09	< 0,09	< 0,09	< 0,09	< 0,09	0,965
Pb	0,13	0,31	0,16	0,85	0,31	1,63

Зерттеу нәтижесі өсімдіктердің өскен ортасы бірдей болғанымен, минералды элементтер құрамы түрдің ерекшеліктеріне байланысты әр өсімдіктің бүл элементтерді бойына сініруі әртүрлі екендігін сипаттайтын. Мәселен, әр өсімдіктің макро және микроэлементтерінің сандық құрамын салыстырсақ, *M. officinalis* өсімдігінде барлық элементтер көрсеткіші өте жоғары. Зерттеу объектілерінің барлығында да макроэлементтер (Na, K, Ca, Mg) мөлшері салыстырмалы жоғары, тек темір (Fe) элементі *Asteraceae* Dumort. тұқымдасының дәрілік түрлерінде *Lamiaceae* Lindl. тұқымдасы өкілдерімен салыстырғанда 20-30 есеге дейін көп жинақталған. Мырыш (Zn) және марганец (Mn) басқа микроэлементтермен салыстырғанда бірнеше есеге жоғары.

Дәрілік өсімдіктердің «дертке – дауа, жанға – шипа» екендігін жүртшылықтың бәрі біледі. Бірақ қарапайым халық олардың қайсысы қай ауруға ем екенін білмеуі мүмкін. Білсе де оларды қалай пайдалануға болатынын жете зерделей алмауы ғажап емес Қазіргі таңда шипалық қасиеті бар өсімдіктерді зерттеу жан-жақты жүргізілуде. Бірақ өлі де болса сырға ашылмаған, толық зерттеуді қажет ететін өсімдіктер түрлері өте көп. Сондықтан да біздің бүл бастаған жұмысымыз осындаид жетіспеушіліктерді азда болса толықтырадар деген ойдамыз.

Пайдаланылған әдебиеттер

- Мухитдинов Н.М., Паршина Г.Н. Лекарственные растения: учебное пособие. – Алматы: Қазак университеті, 2002. – 313 с.
- Лекарства из растений. Под редакции академика АН РК Н.Д. Беклемешева. – Алматы: Мектеп, 2002. – 206 с.

3. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Качественный и количественный анализ основных групп биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах. – Алматы, 2004. - 288 с.

4. Государственная Фармакопея СССР. Вып.2. Общие методы анализа. Лекарственное сырье. МзСССР. 11-ое изд.доп. – Москва: Медицина, 1989. – 400 с.

5. Флора Казахстана. – Алматы: Наука, 1966. – Т. 9. – 514 с.

6. Зимин В.М. Библиотечка лекарственных растений. – СПб.: Дорваль, 1993 – Т. 1. – 264 с.

7. Массагетов П.С. Поиски алкалоидоносных растений в Средней Азии // Тр. ВНИИ лекарственных и ароматических растений. – М., 1947. – Вып. 9. – С. 3-38.

8. Государственный Реестр лекарственных средств, разрешенных к производству и применению в медицинской практике / Государственный Реестр РК. – Алматы: ГНПЦ «Медстандарт», 1994. – Вып. 1. – Раздел II.

9. Климнюк Е.В. Эффективность растительных флавоноидных препаратов при поражении печени противовоспалительными нестероидными средствами // Материалы 2-я респ. конф. по мед. ботанике. – Киев, 1988. – С. 361-362.

10. Аскерова Р.К. Котовники (род *Nereta* L.) Кавказа: автореф. ... канд. биол. наук. – Л., 1954. – 17 с.

11. Шетер Г.К. Лекарственные растения и растительное сырье, включенные в отечественные фармакопеи. – М., 1972. – 120 с.

12. Глухов М.М. Медоносные растения 7-е изд. – М., 1974. – 298 с.

* * *

В статье проведены результаты качественного и количественного исследования фитохимического состава лекарственного сырья шести видов из семейств Asteraceae Dumort. и Lamiaceae Lindl., выращенных в условиях культуры Алматинской области.

The article carried the results of qualitative and quantitative study of the phytochemical medicinal plants of six species of the families Asteraceae Dumort. and Lamiaceae Lindl., grown in a culture of Almaty region.